

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

egyben címke 10 csíkot tartalmazó tasakra

APITRAZ 500 mg impregnált csík mézelő méhek részére A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

LABORATORIOS CALIER, S.A.

BARCELONES, 26 (PLA DEL RAMASSAR)

LES FRANQUESES DEL VALLES

08520 BARCELONA

SPANYOLORSZÁG

2. Az állatgyógyászati készítmény neve

APITRAZ 500 mg impregnált csík mézelő méhek részére A.U.V.

Amitráz

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Egy csík tartalmaz:

Hatóanyag:

Amitráz: 500 mg

Impregnált csík méhkaptárban való alkalmazásra

Fehér színű téglalap alakú csík két darab füllel és hajtási vonallal.

4. JAVALLAT(OK)

Amitrázra érzékeny *Varroa destructor* okozta fertőzöttség gyógykezelésére.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható ismert amitráz-rezisztencia esetén.

6. MELLÉKHATÁSOK

Nem ismertek.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, ebben a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJ(OK)

Mézelő méh (*Apis mellifera L.*)

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Méhkaptárban való alkalmazásra

Kaptáronként 2 csík használandó. Az impregnált csíkokat a keretek közé, a méhfürt magasságában kell fellógatni.

A csíkokat azon keretek közé kell tenni, ahol a méhek a legnagyobb mozgást tanúsítják. A csíkokat úgy kell fellógatni, hogy a méhek szabadon megközelíthessék a csík mindkét oldalát, de azért maradjon egy minimális tér a méhek számára.

Kaptártípusok:

- Dadant típusú kaptárok esetében egy csíkot kell tenni a harmadik és negyedik keret közé, és egyet a hetedik és a nyolcadik keret közé.

- Layens típusú kaptárok esetében egy csíkot kell tenni az ötödik és a hatodik keret közé, és egyet a kilencedik és a tizedik keret közé.

A csíkokat 6 hét elteltével ki kell venni.

A csíkokat nem szabad elvágni.



9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A kezelés idejének meghatározása: A készítmény használata akkor javasolt, amikor a kaptárban már nincs jelen, vagy igen alacsony számú a fedett fiasítás. A készítményt továbbá akkor kell alkalmazni, amikor a méhek még aktívak, vagyis még mielőtt kialakítják az ún. telelőfürtöt, mely éghajlati zónánként változó lehet. Következésképpen a készítmény alkalmazása előtt figyelembe kell venni a fedett fiasítási szintet, valamint az adott földrajzi egységnek megfelelő időjárási viszonyokat.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Méz: nulla nap.

Emberi fogyasztásra kerülő méz gyűjtésének időszakában nem alkalmazható.

A hathetes kezelési periódus alatt mézpergetés nem végezhető.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a címkén feltüntetett lejáratidőn belül szabad felhasználni! A lejáratidő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A tasak első felbontása után azonnal felhasználandó.



12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan:

Az adott méhészet összes kaptárját egyidejűleg szükséges kezelni, a mézrablás elkerülése érdekében.

Az impregnált csíkok egyszer használhatók csak fel, ismételt alkalmazásuk kerülendő. A készítmény alkalmazása nem ajánlott a mézhordási időszak vége előtt, ld. még a kezelés idejének meghatározása szakaszt.

Egyes esetekben amitrázzal szembeni rezisztenciáról számoltak be. Azokban az országokban, ahol az amitráz-rezisztencia ismertén előfordul, a készítmény alkalmazását ideális esetben az érzékenységvizsgálati eredményekre kell alapozni. További tájékoztatásért állatorvoshoz kell fordulni.

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések:

A parazita ellenes készítmények nem megfelelő használata növelheti a rezisztencia kialakulásának kockázatát, ami végső soron a kezelés nem megfelelő hatékonyságához vezethet. A mézelő méhek varroa-fertőzöttségét rendszeresen ellenőrizni kell. A készítményt a Varroa atka elleni integrált védekezés részeként ajánlott alkalmazni. A készítmény biztonságos használatát nem tesztelték az átlagosnál gyengébb, azaz olyan méhcsaládok esetén, ahol a méhek egyedszáma nem éri el az évszaknak megfelelőt.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:

Ez az állatgyógyászati készítmény amitrázt tartalmaz, amely hatóanyag embereknél neurológiai mellékhatásokat okozhat.

Az amitráz monoamin-oxidáz gátló (MAOI); következképpen azok, akik monoamin-oxidáz gátlót tartalmazó gyógyszert szednek, a készítmény alkalmazásakor fokozott óvatossággal kell eljárni.

A készítmény alkalmazása valamint a csomagolás felnyitása során fokozott figyelemmel kell eljárni az esetleges belégzés elkerülése érdekében.

Ez az állatgyógyászati készítmény bőrérzékenységet, allergiás reakciókat valamint szemirritációt okozhat.

Az állatgyógyászati készítmény előkészítése, alkalmazása során egyéni védőfelszerelés, mint védőkesztyű és a méhészetben használt általános védőöltözet viselése ajánlott. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Véletlen érintkezés esetén az érintett bőrfelületet alaposan le kell mosni szappanos vízzel. Szembe kerülése kerülendő. A véletlenül szembe került terméket bő vízzel azonnal ki kell mosni.

Szemirritáció esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét.

Alkalmazás közben tilos étkezni, inni és dohányozni. A készítmény alkalmazásakor a gyermekeket távol kell tartani.

Az alkalmazás után alaposan kezet kell mosni.

Egyéb óvintézkedések

Az impregnált csík valamint a kiürült csomagolóanyag nem kerülhet tavakba vagy más élő vizekbe, mert ártalmas lehet a halakra vagy más vízi élőlényekre.

Gyógyszerkölsönhatások és egyéb interakciók:

Az amitráz toxikus hatása rézsók jelenlétében megnő, a terápiás aktivitás csökken piperonil-butoxid jelenlétében. Ezért e két vegyület amitrázzal való egyidejűleg történő alkalmazását kerülni kell.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok):

A javasolt adag másfészeresének, 8 héten át történő alkalmazása során a méhek elhullásának megnövekedése volt megfigyelhető.

Inkompatibilitások:

Nem ismertek.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet sem a szennyvízbe, sem a háztartási hulladékba!

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2016. február 9.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

10 db csíkot tartalmazó, hegesztéssel lezárt többrétegű fóliatasak, amely a következő 4 rétegből áll: (külső réteg) PET/ LDPE/ alumínium fólia/ hőre lágyuló műgyanta bevonat (belső réteg).

Törzskönyvi szám:

3710/1/16 NÉBIH ÁTI (10 csík)

Exp:

Lot:

